„Physics at LHC“ Mini Schwarze Löcher am ATLAS-Detektor

Matthias Kilgenstein

Seminar am
21.01.2009

THERE'S A 4.2×10^{-9} PROBABILITY THAT THIS
BABY WILL CREATE A BLACK HOLE THAT DESTROYS
THE EARTH

WOW. WHAT'S THE CHANCE
IT WILL DO SOMETHING
USEFUL?

WELL, THERE'S A 4.2×10^{-9} CHANCE THAT
WE'LL BE RID OF PARIS HILTON

Was sind Schwarze Löcher?

Schwarze Löcher an Beschleunigern

Nachweis am Atlas-Detektor

Zusammenfassung

- ▶ Allgemeine Relativitätstheorie $\Rightarrow$ jede Form von Energie erzeugt eine Raumzeitkrümmung
- ▶ Bei einem Schwarzen Loch nimmt die Krümmung von außen nach innen immer mehr zu und wird schließlich im Zentrum des Loches unendlich. Dieser Ort nennt man Singularität.
 $\Rightarrow$ Schwarzschildradius (Ereignishorizontradius)

$$R_S = 2GM/c^2$$

- ▶ Ein Objekt wird als Schwarzes Loch bezeichnet, wenn seine gesamte Masse innerhalb des R_S liegt.
- ▶ Ein Schwarzes Loch verliert bei der Entstehung sämtliche Information darüber, aus was es entstanden ist
 $\Rightarrow$ nur noch durch Masse und Spin charakterisiert.

- ▶ z.B.: Größe des R_S für ein schwarzes Loch von einer Sonnenmasse $M_\odot$:

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$$

$$M_\odot = 1,9891 \cdot 10^{30} \text{ kg}$$

$$R_S = 2GM/c^2 = 2,9 \text{ km}$$

- ▶ Dichte:

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{M}{\frac{3}{4}\pi R_S^3} \propto \frac{1}{M^2}$$

- ▶ Je kleiner die Masse, desto höher die Dichte.

Stephen Hawking postulierte 1974, dass Schwarze Löcher strahlen:

- ▶ der Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs wird durch Lichtstrahlen gebildet, die dem Schwarzen Loch weder entkommen noch hineinstürzen.
 - ▶ die Lichtstrahlen können sich einander nicht nähern
⇒ Fläche des Ereignishorizonts muss gleichbleiben oder wachsen
 - ▶ Errinnert an Entropie ⇒ 2. Hauptsatz der Thermodynamik
 - ▶ Schwarzes Loch muss Entropie besitzen
⇒ es muss eine Temperatur haben
- ⇒ Schwarze Löcher müssen strahlen

Virtuelle Teilchen

- ▶ Im Vakuum entstehen durch Quantenfluktuationen ständig virtuelle Teilchen-Antiteilchen-Paare - eines negativer, das andere positiver Energie
- ▶ Diese Paare können auch am Ereignishorizont entstehen, wobei eines den Ereignishorizont überschreiten kann.

Reale Teilchen

- ▶ reale Teilchen besitzen positive Energie
 - ▶ Abschwächen der Energie durch Gravitationsfeld
→ im SL wird die Energie realer Teilchen sogar negativ

- ▶ Virtuelles Teilchen negativer Energie wird im SL real
→ Verringerung der Masse
- ▶ Virtuelles Teilchen positiver Energie entkommt
→ Strahlung
- ▶ je kleiner das SL desto Unwahrscheinlicher ist es, dass das 2. Teilchen auch hineinfällt $\Rightarrow$ desto höhere Emissionsrate

Verlust von Masse

- ▶ Fläche des Ereignishorizonts wird kleiner
→ Entropieeinbuße → Ausgleich durch Entropie der Strahlung
- ▶ Erhöhung der Temperatur und Emissionstätigkeit

$$T = \frac{\hbar c^3}{8\pi k_B G M}$$

z.B. $T_{M_\odot} = 62 \text{ nK} \ll 2,7 \text{ K}$

z.B. $T_{Mini} = 1,5 \cdot 10^{29} \text{ K}$

⇒ verstärkte Abnahme von Masse

Lebensdauer

$$\Delta t = \frac{M^3}{3\Lambda_t} \text{ mit } \Lambda_t = 3,968 \cdot 10^{15} \frac{\text{kg}^3}{\text{s}} \text{ z.B. } \Delta t_{M_\odot} = 2,1 \cdot 10^{67} \text{ Jahre}$$

z.B. $\Delta t_{Mini} \approx 10^{-27} \text{ s}$

Einteilung nach Masse und Art der Entstehung:

- ▶ **Primordiales SL** kann beim Urknall entstanden sein
 - ▶ M bis zu M_{Mond}
- ▶ **Stellares SL** entsteht durch Supernovä
 - ▶ $M \approx 10 M_{\odot}$
- ▶ **Supermassives SL** im Zentrum von Galaxien entsteht durch Akkretion
 - ▶ $M \approx 10.000 - 10^9 M_{\odot}$
- ▶ **Mini SL** kann an Beschleunigern entstehen
 - ▶ $M \approx TeV$ – Bereich

Quantenmechanische Einschränkungen:

▶ Mindestmasse: Planck-Masse

Sollte ein einziges Teilchen diese Masse haben, werden sowohl Effekte der Quantentheorie als auch der ART wichtig
⇒ Quantengravitation

$$m_p = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} = 1.2 \cdot 10^{19} \text{ GeV}$$

▶ Heisenberg'sche Unschärferelation:

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \Rightarrow \Delta x \geq \frac{\hbar}{2mc}$$

▶ Unschärfe bei SL:

$$\Delta x < R_S \Rightarrow \Delta x < \frac{2GM}{c^2} \Rightarrow m \geq \sqrt{\frac{\hbar c}{4G}} \sim m_p$$

- ▶ Masse eines SLs kann nicht kleiner sein als $m_p \sim 10^{19} \text{ GeV}$
- ▶ Beschleuniger erreichen eine Schwerpunktsenergie von $E \sim 10^4 \text{ GeV}$
→ Fehlen von 15 Größenordnungen (Hierarchieproblem)

Lösung:

- ▶ Der für die Planck-Masse angegebene Wert beruht auf der Annahme, dass sich an der Gravitation bis zu dieser Skala nichts ändert.
- ▶ Hypothese: Es gibt mehr als die uns bekannten 3 Raum-Dimensionen.

Newton'sches Gravitationsgesetz in Orts-Dimensionen:

- ▶ in 3 Dimensionen:

$$F = G \frac{m_1 \times m_2}{r^2}$$

- ▶ in 2 Dimensionen:

$$F \sim \frac{m_1 \times m_2}{r}$$

- ▶ in 1 Dimension:

$$F \sim m_1 \times m_2$$

⇒ Abhängigkeit von Anzahl der Dimensionen

- ▶ in n-Dimensionen:

$$F = G \frac{m_1 \times m_2}{r^{n-1}}$$

- ▶ Die EM-Felder des Standard Modells sind auf die 3 Dimensionen („Brane“) begrenzt.

- ▶ Die Brane sind in eine höherdimensionale Welt inklusive Extradimensionen („Bulk“) eingebettet.
- ▶ Gravitationsfeld kann in alle Dimensionen vordringen

Die Extradimensionen unterscheiden sich stark von den bekannten 3:

- ▶ Newton'sches Gravitationsgesetz ist für Längen $> 100\mu\text{m}$ bestätigt
→ Extradimensionen können nur bei sehr kleinen Abständen relevant werden.
- ▶ Extradimensionen sind aufgerollt („kompaktifiziert“)
- ▶ Durch die zusätzlichen Dimensionen d ändert sich m_P

$$m_P^{2+d} \propto \frac{m_P^2}{R^d}$$

Entstehung und Vernichtung Schwarzer Löcher

0 s

Entstehung durch Quark-
kollision

$0-10^{-27}$ s

Emission von Gravitations-
wellen, Photonen und gela-
dener Teilchen, Ladung ver-
schwindet schnell

$1 - 3 \times 10^{-27}$ s

Abbau des Drehimpulses
durch Strahlung

$$3 - 20 \times 10^{-27} \text{ s}$$

Masseverlust durch
Hawkingstrahlung

$$20 - 22 \times 10^{-27} \text{ s}$$

Erreichen der Planck-
Masse, Zerfall des Lochs

Nachweis im Detektor

Particle Data Group ID

Quarks:	d	1
	u	2
	s	3
	c	4
	b	5
	t	6
Leptonen:	e^-	11
	ν_e	12
	μ^-	13
	ν_μ	14
	τ^-	15
	ν_τ	16
Bosonen:	g	21
	γ	22
	Z^0	23
	W^+	24
	h^0/H_1^0	25

- ▶ zeigt die entstandenen Teilchen beim Zerfall eines Schwarzen Lochs

Transversalimpuls

- ▶ Es werden Teilchen mit hohem P_t emittiert
- ▶ Mehr extra Dimensionen n sorgen für höheres P_t

Pseudorapidität

- ▶ $\eta = -\text{Intan}\left(\frac{\theta}{2}\right)$
- ▶ die Verteilung η hängt kaum von n ab

Multiplizität

- ▶ Multiplizität gibt an, wie viel Teilchen pro Event entstehen
- ▶ bei höherem n sinkt die Multiplizität
 - ▶ Hawking-Temperatur ist höher
 - ▶ einzelne Teilchen tragen mehr Energie

Trigger

- ▶ Der Ein-Jet-Trigger hat die größte Effizienz um auf Schwarze Löcher zu triggern
- ▶ Aus der Vielzahl von hohen p_T -Jets pro Event resultiert eine hohe totale Effizienz. Bei einer Trigger-Treshold von 400 GeV von 99%.
- ▶ Die Eventrate Schwarzer Löcher ist niedrig genug, sodass kein Prescaling nötig ist

Fehlende Transverselle Energie

- ▶ Ein Schwarzes Loch emittiert auch Neutrinos und Gravitons, die man in Form von fehlender transverseller Energie registriert.

Summe des Transversalimpulses

um den Hintergrund zu reduzieren führt man cuts durch:

- ▶ $\sum |p_T| > 2,5 TeV$
- ▶ bei der Anwesenheit eines Lepton mit $p_T > 50 GeV$

Masse Schwarzer Löcher

Die Masse von Schwarzen Löchern vor (links) und nach (rechts) den cuts

- ▶ Hintergrund wird sehr stark reduziert

Entdeckungspotenzial

- ▶ Schwarze Löcher können bei einer Luminosität von wenigen pb^{-1} im Bereich von 5 TeV bei $1 fb^{-1}$ im Bereich von 8 TeV entdeckt werden

Zusammenfassung

- ▶ Der LHC ist das erste Experiment, das Objekte im TeV-Bereich erzeugen kann
 - ▶ LHC hat das Potenzial, Mini(TeV)-Schwarze-Löcher zu erzeugen
- ▶ Atlas hat die Möglichkeit, die Signatur von Schwarzen Löchern zu detektieren
 - ▶ Für eine Entdeckung im 5 TeV-Bereich braucht man nur wenige pb^{-1}

⇒ Schwarze Löcher sollten in wenigen Tagen entdeckt werden